

金剛寺本『医心方』卷第十三 (翻印)

東野 治 之

凡 例

一、ここに翻印するのは、金剛寺(大阪府河内長野市)所蔵の鎌倉時代前期書写、『医心方』卷第十三の全文である。この写本についての詳細は、拙稿「河内金剛寺新出の鎌倉時代書写『医心方』卷第十三について」(本誌三二―三、一九八六年)を参照されたい。

二、印刷の都合上、異体字、異体の仮名は、正字または通行の字体に改めた。

三、欠損の文字及び判断不能の文字は□で示し、残存筆画から推定可能な字は、その右傍に()付で示した。

四、見せ消ちは原本通りとしたが、転倒符のある個所や行間に補入文字のある個所は、組版の都合上、全て訂正した結果を示した。

五、原本には明らかな誤字、脱字もみられるが、それらは特に断らず、原本通りとした。

六、原本に丁数の表示はないが、いま脱葉を復原して丁数を付し(表紙の分は除く)、各丁の最終行に、第一丁表ならば「一才」の如く示した。

七、本稿には、本年七月と九月の調査で発見した脱葉二枚(第九丁及び第三三丁)の内容も併せ収載した。なお第三三丁の出現によって、本写本には校合奥書しか存しないことが確かめられた。

〔第一折〕

(表紙欠)

醫□方卷第十三

□□下行鍼博士□丹波介丹波宿祢康頼撰

□□七傷方第一 治虚勞羸瘦方第二

治虚勞夢泄精方第三 治虚勞尿精方第四

治虚勞精血方第五 治虚勞少精方第六

□□不得眠方第七 治昏寒喜眠方第八

□□汗出方第九 治陽虚盜汗方第十

□□第十 治肺痿病方第十四

□□第十一 治肺痿病方第十四

□□第十二 治肺痿病方第十四

□□第十三 治肺痿病方第十四

□□第十四 治肺痿病方第十四

□□第十五 治肺痿病方第十四

□□第十六 治肺痿病方第十四

□□第十七 治肺痿病方第十四

□□第十八 治肺痿病方第十四

□□第十九 治肺痿病方第十四

□□第二十 治肺痿病方第十四

□□第二十一 治肺痿病方第十四

□□第二十二 治肺痿病方第十四

□□第二十三 治肺痿病方第十四

□□第二十四 治肺痿病方第十四

□□第二十五 治肺痿病方第十四

□□第二十六 治肺痿病方第十四

□□第二十七 治肺痿病方第十四

一才

酸棗人栢子人 薏苡人 芍杞子地床子五味子
菟糸子 菊子 菴蘭子荊子地 膚子烏麻子

署預 桂心 干地黄

十五味加縱容三兩餘各二兩酒服如梧子廿九日二

范汪方開心署預腎氣丸治大夫五勞七傷極

□耐寒眠即臚脹心滿雷鳴不欲飲食雖食心下停

淡不能消春夏手足煩熱秋冬兩脚凌冬虛多

忘腎氣不行陰陽不發絕如老人服之健中補髓

填虛養志開心安臧止淚明目寬胃益陰除

風去冷

□所不治方

宍縱容一兩 山菜莢一兩 一方无 干地黄六分 干薑

遠志六分 地床子五分 五味子六分 防風六分

兔糸子六分 杜仲六分 署預六分

凡十二物搗下篩蜜丸如梧子服十丸至廿九日

二夜一若煩心即停減之只服十丸為度服藥五日

莖熾熱十夜邊體滑澤十五夜顏色澤手

足熱廿夜雄力欲盛廿五夜經脉充滿卅夜熱

氣朗徹面色如花手文如孫血心開記事不忘

去愁止忘獨寢不寒止尿洪陰年卅以下一劑即

足五十以上兩劑即足滿七十亦有子婦人析續

者服一劑五十得子无所禁但忌大辛酢

又云六生散治五勞七傷五緩六急治寒熱脹滿

大腹中風垂曳消微逐血補諸不足令人肥白方

生地黄根二斤 生薑一斤 生昌補根一斤

生芍杞根一斤 生烏頭一斤 生章陰陸根一斤

凡六物合七斤 熟洗之停令慘粗一切之美酒二斗

都合漬三四日 爆之暮輒還着酒中趣令汁盡

止擣末下從酒服半錢上日三十日之後增至一錢以

試有驗

煎藥方云蘇蜜煎治諸湯及內補方

蘇一升 蜜一升 地黄煎一升 甘葛煎一升

大棗百枚 伏苓人參署預各三兩

右八物先蜜蘇入合攪洋後甘葛煎入洋棗

膏以純絞入然後伏苓人參署預等散入合

後入地黄煎微火煎不止手攪令之

今案蘇蜜煎方有數首或藥種多少不同或

分兩升合各異仍取當今名醫增損之法以

備俗用藥種如左

蘇小一升蜜小一升 煎去滓无 甘葛煎大三升

地黄煎大二合五夕 麥門冬煎大二合五夕生

薑大五升 春得大五合 煎大棗百五十枚 取肉 練胡麻

大三合 熟春 干署預小三兩 春篩 伏苓小二兩

春篩 凡十物先以蘇入生薑煎之令相得次

以甘葛煎和大棗練胡麻絞去滓入干署預伏

苓次入麥門冬煎地黄煎皆入諸藥微火大煎

不離手攪令和調至與尾下火亦不止手攪冷

但或方如棗大服二九日三或如鷄子大服一丸日

3オ

4ウ

2ウ

4オ

2オ

3ウ

三今亦多少任意入酒服之

離酒方極杷石決明酒治除腰脚疾疝癰諸風痺

惡血去目白膚翳赤膜痛眨々淚出瞽盲輕

身補腎氣和百節好顏色延壽

肥健長變方

六一斗一升二合
五斗
石決明乾者一大斤洗家芍杞根白皮小一斤

右二物細切盛絹代布以清酒四斗五升漬亦

春五日夏三日秋七日冬十日去澤始服多少不占

大清經五茄酒治五勞七傷心痛血氣之弱男子陰

痿不起囊下恒温少便餘瀝而陰痒及腰脊痛

兩脚疼痺風弱五緩六急虛羸補中益精堅筋

骨強志意久服輕身耐老耳目聰明落齒更生白髮

更黑身躄輕強顏色恍澤治婦人產後餘疾百病

常用雄不用雌之五葉者雄之三葉者雌之雄者味

甘雌者味苦夏用荃葉冬用根皮切一升盛絹袋

以酒一斗漬春秋七日夏五日冬十日去澤温服任意

勿醉此藥禁物但死尸并產婦勿見也日食五

茄不用黃金百庫也

賀蘭方苟杞煎主五内耶氣熱中消渴周痺

風濕胃腹遊氣客熱頭痛内傷大勞虛損頭面

遊風々頭眼眩五瘵脚弱痿四支拘攣膝痛不可

屈申傷中少氣陰消腫疼憂患驚耶恐悸心

下結痛煩滿欬逆口焦舌乾好睡隔中淡水之腫陰

下痒濕小便餘瀝脚中酸痛不欲踐地身中不足四支

沈重時嘔噦折跌絕筋積聚五勞七傷目暗清

旨熱赤痛補虛羸除寒熱益氣力長肌肉止腰

痛充元五藏利小便益精氣止洩精久服耳目聰

明陰氣長強堅筋骨填髓髓養神安魂令人身

輕能跳越峯谷不老而長生也

芍杞根切大一石以水大三斛入煮取五斗汁去

滓加署預藕根各二大升煮取一大斗次牛膝伏

石解杜神各大一斤以水五斗煮取一大斗次弟根

蘆根各大一斗以水一解煮取一斗加棗膏大一升煮

取令減半混合三汁煎令減三分之二次加地黃

大二升麥門冬煎大二升次加蜜大一升千歲葛汁煎

大二升冬時蘇大二升精煎令如糖停冷納漆器

密封始服如彈丸大一丸日三今案加生薑汁

錄驗方生地黃煎補虛除熱將和取利也散石癰

疽瘡癰痔熱皆宜之方

生地黃根隨多少春校取汁復重春校取之盡其

汁乃除去滓也以新布重絞其汁去滓碎濁令清淨

置鉢中置陰湯上煮釜勿塞全邊令湯氣得泄不

沓也煎地黃汁竭減半許後煎下更以新布絞去

碎結濁滓滅去復煎竭之令如飴糖成煎北方地

黃肥味濃作煎甘美東南地黃堅細味薄作煎

鹹苦不美然為治同耳能多作則美好也少作則

易竭苦々不美然少作不可減三升汁

治虛勞羸瘦方第二

5 才

6 寸

5 寸

7 才

6 才

7 寸

病源論云夫血氣者所以榮養其身也虛勞之人精
髓萎竭血氣虛弱不能充盈肌膚故羸瘦也
錄驗方芍杞丸治勞傷虛損方

芍杞子三升 干地黄切一升 天門冬切一升
凡三物細搗曝令干以綃羅之蜜和作丸大如
彈丸一服一丸日二

范汪方云補養湯主虛勞羸瘦食已少氣方

甘草一兩炙木四兩牡蠣二兩大棗廿枚阿膠三兩

麥門冬四兩法凡六物咬咀水八升煮取二升盡服禁生冷

千金方甘草湯主虛羸懷々氣欲絕方

甘草二兩生薑二兩人參一兩五味二兩茱萸

一升五味水四升煮茱萸令如蟹目沸去滓內

藥煮取一升六合分再服

又云小鹿骨煎主治一切虛羸皆悉服之方

鹿骨一具碎芍杞根切一升二味各以水一斗別器煎

各取汁五升去澤澄乃合一器共取五升二日服盡

好將須用大升

本草拾遺云鯽魚肉主虛羸熟煮食之

耆婆方治人瘦令人肥健肥白能引陰陽并去風冷

虛瘦無力神驗方

取楓木經五年以上樹皮去上黑皮取中白皮五斗

細剉微曝令水氣去以清美酒於白瓦器中漬之

依春夏七日期冬二七日少々飲酒々欲盡主下瀉

似如楓膠少々七取食之不經數月即肥白立驗忌如法

9才

拯要方云芍杞子酒療虛羸黃瘦不能食肥之不遇
兩劑必得
肥充无禁斷方

芍杞子五大升乾者碎生地黄三大升切大麻子五大升碎
右於甑中悉麻子便熟下差板上攤去熱氣冷
暖如人肌內地黃芍杞子熟按三物於得內絕袋

中以无灰清酒二大斗浸之春夏五日期冬七日取服

任性多少常使體中微酒氣

〔第二折〕

明堂經云脾輸二穴灸三壯主中氣脹引脊痛食

飲多身羸瘦名曰食晦注云晦月盡謂陰氣盡陽

氣盛所以消食羸瘦

治虛勞夢泄精方第三

病源論云腎虛為耶所乘耶客於陰則夢交接令腎

虛弱不能制於精故因夢感動而泄精

小品方別離散治男女風耶男夢見女々夢見男

悲愁憂患喜无常或半年或數月日復發者方

楊上寄生一兩木三兩桂心一兩一方三兩茵芋一兩天

雄一兩炮許根一兩薊根昌蒲一兩細辛一兩附子一兩炮

干薑一兩凡十物合搗下菘酒服半方寸匕日三合

藥勿令婦人鷄犬見之又无令見病者々々家人

見合藥知藥者令耶氣不去禁之為驗

又云龍骨散治男子失精百術不治方

龍骨大如指赤理錦文者草二兩桂肉二兩

10才

9才

干薑二兩 凡四物^〇〇^〇〇^〇方寸七日三升良

10ウ

又云葶子湯治失精方

葶子一升 龍骨三兩 袁石脂三兩

凡三物以水七升煮取二升半分三服

集驗方治夢泄精方

葶子一升 熬一物搗篩酒服一方寸七日再升^〇

醫門方療夢交接泄精暫睡即出身體枯瘠骨

立者方 白龍骨八分^研 葶子一升半 為散酒服方

寸七日二加至一七半日二

採要方云小便失精及夜夢洩精方

葶子一升^熬 麥門冬二兩 兔糸子二合 東前子二合

芎芎二兩 龍骨二兩 已上以水八升煮取二升為

四服日三

玉房秘決云治數夢交失精方

龍骨 牡厲甘草桂^{各三兩} 大棗一枚

水六升煮取二升半分三服

僧深方云禁精湯主^〇精羸瘦酸消少氣視不

明惡聞

人聲方 葶子二升 生粳米二升 二物合於器^〇

熬之米黃黑及熱急以淳佳酒一斗^〇之校取七

升服一升日三二劑便愈

雜錄方治失精方

取葶根搗取汁服五合日二

又方石榴皮搗為散飲服方寸七日二又方葶子一升

11ウ

桑螵蛸十四枚水五升煮取二升三服亦為散酒服

12才

葛氏方云治男女夢與人交接精便泄出此內虛

積滯耶氣感發治之方 葶子一升 粳米一升 水四

升煮取升半一服又方龍骨二分 朮四分 桂二分 天

雄一分 搗末酒服五分 七日三又方兩足內踝上夫

脉上名三陰交灸廿一壯 夢比斷 又方合手掌

并大母指令兩爪相近以一主^〇兩際角令半入

爪上三壯

11才

又云治男女精平常自^〇或^〇見所好感動便^〇發

此腎氣^〇少不能^〇〇^〇

巴戟天 石斛 黃耆 分等搗酒服方寸七日^〇

又方鹿茸^〇一兩 桂一尺 薤子一升 附子一枚

澤瀉^〇三兩 搗末服五分 七日三又方牡丹炙令變

色搗末服方寸七日三 又方雄鷄^〇鯉魚膽^〇〇^〇

陰頭

治虛勞尿精方第四

病源論云腎^〇藏精而氣通於陰勞傷腎虛不能

藏於精故小便而精液出

千金方治虛勞尿精方

葶子一升 稻米二升 水一斗七升 煮如粥取汁六升^〇

葛氏方治男子溺精如米汁及小便前後者精如^〇

涕或溺有餘瀝汚衣此皆內傷令人虛絕治之方

栝樓二分 滑石二分 石韋一分 搗末以麥粥服方寸^〇

又方甘草赤石脂分等搗末服方寸七日三

13才

12ウ

易終夜常枕五愈

雀虫錫食經云藥治也□□（眠）意不定

本草經陶景□□榆□□□□人以作糜羹輩令

人眠睡嵇公所謂榆令人眠

小品方流水湯主虛煩不能眠方

半夏三兩洗 秫米一升 伏冬四兩

凡三物以流水二斗楊之三千過令勞煮（三）物

得五升分服一升日三夜再

繪深方小酸棗湯治虛勞藏虛意不得眠煩不

寧方 酸棗二升知母一名也 二兩干薑二兩 甘草一兩

伏冬二兩 芎二芎二 凡六物切以水一斗煮棗減

三升分三服

治昏塞喜眠方第八

病源論云嗜眠者由人有腸胃大皮膚澁者則分

肉不開解其氣行在於陰而遲留其陽氣不精神

爽昏塞故令嗜眠

葛氏方治嗜眠喜睡方

葛氏方（目） 鼠（病作鼠） □□□膏和注目外此（目）則

又不□□□又取□□絳帛裏帶之

又方麻黃朮各五分甘草三分日中向南搗末食後

服方寸匕日三

又方孔公薛子末五兩 通草三兩茗葉一斤水一斗

煮取五升向暮服之即一夕不睡

龍門方療嗜睡眠方

16ウ

馬頭骨燒作灰服方寸匕日三夜一差今案陶潛方服

方寸七令人不睡

又方苦參三兩木二兩大黃一兩搗末蜜丸梧子每

食後服卅丸驗

治耶傷汗血方第九

病源論云肝藏血心之液為汗言肝心俱傷於耶故

血從膚腠血出也

醫門方治汗血吐血方

青竹加三兩生地黃五兩人參一兩桔梗一兩

芎二芎二 一兩當歸一兩桂（二） 兩甘草二兩炙

右切以水（五）升煮（三）去滓分溫三服甚升効

小品方治吐血汗血大小便血竹茹湯方

竹茹二升甘草六分當歸六分芎二芎二 六分黃芩六分

桂心一子兩 木一兩人參一兩夕藥一兩 凡丸物以水

一升煮取三升分四服

治虛汗方第十

病源論云諸陽主表在於腠理之間若陽氣偏虛則

津液發泄故為汗多則損於心々液為汗故也

小品方治汗出如水漿及汗血衄血吐血小便血歿死

都梁香散方 都梁香（調草一名） 二兩 此糸苑一兩桂莞一兩

人參一兩生竹茹一兩肉縱客一兩干地黄二兩

凡七物治篩以水服方寸匕

千金方治汗出方豉一升酒二升漬三日服之不過三劑差

范注方治汗粉藥方

18ウ

18ウ

19ウ

17ウ

牡厲二兩干薑二兩附子一兩炮

凡三物搗下以藥一合ハクニ粉二合和合摩汗出處

〔第三折〕

僧深方治大虛汗出欲死若白汗出不止方麻黃根二兩

凡一物以清酒三升微火煮得一升五合去澤盡服之

効驗方治人汗勞不止麻黃丸方

麻黃根二兩 石膏一分

凡二物治篩 和蜜丸大人服小豆三丸日三小兒以

意增損

錄驗方治掖下汗出作瘡方

藜皮三兩 黃連三兩甘草三兩 米粉四兩

凡四物治蓂成粉汗出時粉之

又云止汗石膏散方 石膏四兩甘草四兩合

搗先食漿服方七日三陶景本草注云麻黃節及

根夏月雜粉用之

治風汗方第十一

經云凡熱者欲汗出為通氣也而皮膚縱蜜不行出也

風者欲汗不出為身疲也而皮膚疎薄汗出不止

范注方治風汗出方

(この間、21オ・21ウ欠)

麻黃三分 故敗扇扇□□□分

凡三物治篩以乳服三分七日三大人方寸七日三

治傳屍病方第十三

玄感傳屍方云夫傳屍之病為蠹寔深大較男夫

19ウ

多以絃癥及勞損為根女人乃□血氣或注為本然比見

患者百有餘人得狀不同為療亦異形候既衆名

号又殊所以然者中華ハ通曰傳屍蜀土都名瘦病江

左稱為轉注野俗謂之伏練下里名為殍動殍小兒

乃日无事因虛損得名為勞極骨中熱者為骨

蒸微嘔者稱日肺痿神鬼為崇名之復連云

又云論曰大都男女傳屍之候心胃滿悶背膂煩疼

兩目精明四支无力雖知卧睡恒不嗜脊脊急痛膝

胫酸疼多卧小起状似伴病每至且起即精神好

欲似无病從日午以後即四體微熱面好顏色不喜

見人過常懷忿悲纒不稱意即欲嘔怒行立脚

弱夜卧盜汗夢与鬼□□□先亡或多驚憐有

時氣急有□欬嘔雖□□□食而不能多食死

須與神而精神尚好兩助虚肋イ々々々腹或時微痢

鼻口乾燥垣多黏唾有時脣赤有時欲睡漸

就沈羸猶如水洞魚不覺其死矣

又云論曰傳屍之疾本起作无端莫問老少男女皆

有斯疾大都此病相尅而生先内傳毒氣周遍五

藏漸就羸瘦至於死々々訖復易親一人故曰傳屍

亦名轉注以其初得半卧半起号殍殍内傳五藏

名之伏練不解療者乃至減門假ト如男子因虚損得

之名為勞極與楚云淋瀝也其源先從腎起腎初受

氣兩胫酸疼腰脊拘急行立脚弱食飲少兩耳

聾々欲似風静夜卧夢洩陰泮痿弱腎既受已

20オ

20ウ

22ウ

23オ

次傳於心々初々受氣夜因心驚或多松悸懸乏氣

吸之欲盡夢見先亡有時盜汗食无滋味口内生瘡

心恒煩熱唯欲眠因朝輕夕重兩頰口唇皆悉紅

赤手足五心亦皆熱□□□次傳於肺々初受

氣有時致嘔氣微弱□□□喘氣因即更甚鼻

口乾燥不聞香臭假令得聞唯覺朽腐物氣

氣時惡心憤々欲吐肌膚枯燥或時刺痛或似出

行乾皮細起狀如起□脚肺既受已次傳於肝々初

受氣兩目漠々面无血色常欲嘔眉視不及遠目

恒乾澁又時赤痛或復精黃終瞢鬱欲合眼及好

卧睡還不看、肝既受已次傳於脾々初受氣兩脇

膚脹食不消已 又時渴利熟食生出有時肚痛

腹雷鳴腎舌焦乾或生瘡腫毛髮豎无有光潤

或復上氣極肩喘息利赤黑汗至此候者將死之證也

又云傳屍骨蒸伏練殍相染滅門神秘方

紫胡三兩 桑根白皮五兩甘草二兩 桔梗三兩

續斷三兩 紫苑四兩 赤小豆一升 青竹茹三兩

五味子三兩 干地黄五兩无者以生十兩代 若熱更加石膏

三兩末若不下食更加生麥門冬二兩去心

凡九物切以水九升煮□□□合絞去滓分温三服々

去如行七八里重者服五□□輕者兩三劑隔五六日一

服忌如藥法

又云主傳屍骨蒸例多盜汗粉身方

麻黃根三兩杜厲粉三分瘻子二鈞兩就末

23ウ

沙半兩末 白朮六分胡鷄脂一兩 凡六味搗篩

絹袋子盛之夜因汗出傳之

又云主傳死骨蒸鬼氣惡寒熱諸風虛疥癬搔□方

直用桃柳槐蒨薔薇四種枝葉各割一大升以水九

大斗煮取五大斗去滓加塩二大升浸之於急夜

又云主傳屍伏練殍骨並絃癰鬼氣惡寒悒々或

如瘡等炙之方 大椎上穴及兩傍纒下少許對椎

節間各相去一寸半二穴名大椎 又兩助下背間反ワキホネ 名章門二穴

又當此心脊上兩傍各□□一寸二穴合七穴日取正

午各名七壯滿一百五十壯即覺漸差

又云主傳屍殍喜厭夢者炙商丘二穴在足內踝下徹前陷中灸

廣濟方療瘦病伏練前患氣惡注朱砂丸方先明

朱砂大兩□桃人七十枚□□ 麝香三分研

右研朱砂麝香令細末後用桃人香砂為丸如□□

不斂以蜜少許合成訖清飲服一七丸日二服夜一服

不痢忌雜肉及辛

又云療傳屍骨蒸殍肺委瘥忤鬼氣卒心痛

霍亂

吐痢時氣鬼魅瘴癘赤白暴痢瘀血目明閉眩癩

下腫敬痼鬼忤中吐乳狐狸吃力伽丸方

吃力伽白朮是光明沙 麝香當門子梨勒勒皮

香附子沈香重者青木香丁香香安悉香檀香

畢撥敬斯犀角已匕各重陸香蘇合香龍腦香

半兩已上各右研搗篩極細白蜜前去沫和為丸每朝

26才

25才

取井華水服如梧子四丸於□中研破服之老

少每研一丸服之仍取一丸如彈丸鷓紙裏緋袋盛

當心帶之一切邪鬼不敢近千金不傳冷水□水□時
斟量忌五辛臘月令之□神藏於蜜器中勿令

洩氣升効

治骨蒸病方第十四

病源論云夫蒸病有五一日骨蒸二曰脉蒸三曰皮蒸四曰肉

蒸五曰內蒸又云有廿三蒸一胞蒸□□蒸三臚蒸四

髓蒸五腎蒸六筋蒸七血蒸八脉蒸九肝蒸十心蒸十

一脾蒸十二肺蒸十三腎蒸十四膀胱蒸十五膽蒸

十六胃蒸十七小腸蒸十八大腸蒸十九上焦中焦蒸廿

肉蒸廿一膚蒸廿二皮蒸廿三氣蒸云

玄威傳屍方云論曰凡人唯知有骨蒸名而不知亦有心

腎等蒸云又云五蒸病者附骨毒之氣療之通用生

地黃汁 不限日數此方神驗云

又云一曰骨蒸者其根在骨且起體涼目晚即熱煩躁

不能安食无味小便赤黃急之□□細喘而无氣腰疼

兩足逆冷手心常熱蒸盛過傷內即變為甘食人

五藏若大便澀者与芒消一七三日眼乃亦可搗苦□

為散蜜和□□如梧子大一服七丸日再服无所禁忌以

身輕涼□□食為度

二曰脉蒸甘根在心日增煩悶擲手出脚翕思□□

唾即浪言或驚恐不安脉數若蒸盛之時變為甘

齊下悶或暴利不能止若利方 □參二兩青箱二兩

艾葉一兩甘草一兩炙切以水四升煮取一升半分為

二分半胞中々盛灌下部若不利尿芒消方寸匕

三日皮蒸其根在肺必大喘鼻乾口中无水舌上白小

便赤如血蒸盛之時胃滿或自稱得注熱兩脇下脹

大嘔徹背速脾疼眠寐不安或蒸毒傷臑口唾血

急与芒消一兩日不過三服之訖冷水没手以熨脇間及

腋上白下第三脇カクハレホネ問下脇下空中七壯炙之四曰肉蒸其

根在脾體熱如大煩躁无汗心腸鼓臍食即欲嘔

小便如血大便澀蒸盛之時或體□赤不能安寐者

宜取大黃一兩半切以如小豆以水一升浸經一宿明

絞取汁一服五合許微下即止若熱不定□服□

消一七日二服□意以涼為度

五曰內蒸□□血蒸所以名內蒸者必外寒而內熱

把手附骨而肉熱其在五藏六府其人必□患後得

之骨肉自消飲食无味或皮疹而无光澤蒸盛之

時四支漸細足 跌アチラヒレ腫起宜搗□□十兩為一劑細

研如鍾乳法和水一服方寸匕日再服為佳以涼為

度上件五蒸悉因持患愈後食羊肉皮肥膩或酒

或房而得久蒸不除終變為甘必須先防下部不

得忌之妄禁六孔

又云圭大夫困虛勞損夢洩盜汗小便餘瀝陰

濕弱欲成骨蒸者名曰勞極黃耆大補腎湯方

黃耆三兩生薑三兩人參三兩大棗廿枚擘

牡蠣二兩 夕藥三兩桂心三兩五味子三兩地骨

26ウ

28オ

27オ

28ウ

27ウ

29オ

□□□水七升煮取三升分三服今案千金方甘草三兩大棗十枚

□□ 第十三

一交了

(補注) 左傍訓の「六」(音)の下は墨抹。

33
才